

Eliminación del arroz de marisma (Spartina) en Duck Bay — Recuperación de la marisma y del hábitat de peces en el noroeste de Tasmania

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Australia

Puntuación de calidad: 33/100

Solidez de la evidencia: Cautelar / limitada

Resumen

Tras el control con herbicida, financiado por el Gobierno australiano, de la *Spartina* anglica invasora en Duck Bay, las especies de peces pasaron de 5 a 11 y las capturas se multiplicaron por ~20 en tres años; volvió la marisma nativa (Austral Ecology).

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	1/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

[C-NAPSE web research](#) — consultado el 2026-09-30

[Circular Head Landcare Group / University of Tasmania](#) — consultado el 2026-09-30

[Austral Ecology \(Pralhad et al.\)](#) — consultado el 2026-09-30

[University of Tasmania](#) — consultado el 2026-09-30

[Pulse Tasmania](#) — consultado el 2026-09-30

Citar — Evidoria. *Eliminación del arroz de marisma (Spartina) en Duck Bay — Recuperación de la marisma y del hábitat de peces en el noroeste de Tasmania*. ID persistente: f17b92a4-a385-406e-b74e-2d4ab2ffaa9f.