

Control de la espadaña en los humedales de Hadejia-Nguru y Fondo Fiduciario de la Cuenca — restaurar una llanura aluvial saheliana en retroceso (Nigeria)

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Nigeria

Puntuación de calidad: 20/100

Solidez de la evidencia: Cautelar / limitada

Resumen

La espadaña (Typha) cubre ~35 000 de las 58 100 ha de los humedales de Hadejia-Nguru; los ensayos indican que cortar 15 cm bajo el agua es lo mejor. Existe gobernanza de cuenca, pero los resultados de la restauración no están cuantificados.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	1/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-10-30

Hadejia-Jama'are-Komadugu-Yobe Basin Trust Fund / Joint States IWRM Committee / Ahmadu Bello University — consultado el 2026-10-30

Typha ecology and control study (Int. J. Bonorowo Wetlands, 2019) — consultado el 2026-10-30

Communities restoring HJKY basin livelihoods (River Resource Hub) — consultado el 2026-10-30

Citar — Evidoria. Control de la espadaña en los humedales de Hadejia-Nguru y Fondo Fiduciario de la Cuenca — restaurar una llanura aluvial saheliana en retroceso (Nigeria). ID persistente: 84a45b2c-db5b-4f61-8171-5d4fd52d2fb7.