

Técnica de Transferencia de la Capa de Musgo — Norma Canadiense de Restauración de Turberas

PES & Nature-Based Solutions · Good practice · Canadá

Puntuación de calidad: 73/100

Solidez de la evidencia: Observational / pre–post

Resumen

Desde 1992, el Grupo de Investigación en Ecología de Turberas de la Universidad Laval y la Asociación Canadiense de Musgo de Esfagno han desarrollado y hecho obligatoria la Técnica de Transferencia de la Capa de Musgo para turberas post-extracción, hoy adoptada en Sudamérica, Japón, Australia y Europa; más de una década de monitoreo científico revisado por pares muestra el retorno a la función de sumidero neto de carbono.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	3/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	3/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	3/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-07-10

Peatland Ecology Research Group (Université Laval) / Canadian Sphagnum Peat Moss Association — consultado el 2026-07-10

Canadian Sphagnum Peat Moss Association – Canadian Peatland Restoration — consultado el 2026-07-10

Université Laval GRET-PERG – Peatland Restoration (Moss Layer Transfer Technique) — consultado el 2026-07-10

Waddington et al. 2010, JGR Biogeosciences – Toward restoring the net carbon sink function of degraded peatlands — consultado el 2026-07-10

Citar — Evidoria. *Técnica de Transferencia de la Capa de Musgo — Norma Canadiense de Restauración de Turberas*. ID persistente: 934430de-b667-4219-8c23-6118dddf1f8.