

Humedal de Nakivubo — Filtración natural de aguas residuales antes del lago Victoria, y su declive

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Uganda

Puntuación de calidad: 27/100

Solidez de la evidencia: Cautelar / limitada

Resumen

Un humedal de papiro filtraba hasta el 99% de los coliformes fecales de Kampala antes del lago Victoria, valorado en 1.500–2.900 USD/ha/año en 1999, pero ha perdido desde entonces más de la mitad de su vegetación, y en 2016 ya no protegía la calidad del agua.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

[C-NAPSE web research](#) — consultado el 2026-08-29

[Kampala Capital City Authority / National Water and Sewerage Corporation](#) — consultado el 2026-08-29

[IUCN/Uganda National Wetlands Programme valuation \(1999\)](#) — consultado el 2026-08-29

[World Bank / KCCA assessment \(2016\)](#) — consultado el 2026-08-29

[Kansiime & Nalubega treatment study](#) — consultado el 2026-08-29

[Fuhriemann et al. 2015, contamination study \(PMC\)](#) — consultado el 2026-08-29

Citar — Evidoria. *Humedal de Nakivubo — Filtración natural de aguas residuales antes del lago Victoria, y su declive*. ID persistente: b5b26666-3da6-4c18-a499-b3b76257e5e1.