

Control Biológico del Jacinto de Agua en el Lago Victoria — Recuperando la Represa de Owen Falls y la Pesca en Uganda

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Uganda

Puntuación de calidad: 40/100

Solidez de la evidencia: Observacional / pre-post

Resumen

Gorgojos *Neochetina* liberados desde 1995 redujeron la alfombra de 20.000 hectáreas de jacinto de agua del lago Victoria a unas 500 hectáreas en 2000, liberando la toma de agua de la represa de Owen Falls en Uganda y aumentando las capturas de pescado — aunque el rebrote impulsado por nutrientes regresó en 2006, mostrando los límites del control biológico.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-09-13

Uganda National Agricultural Research Organisation (NARO); Lake Victoria Environmental Management Project (LVEMP) — consultado el 2026-09-13

SciDev.net: Lake Victorious — weevils defeat water hyacinths — consultado el 2026-09-13

NASA Earth Observatory: Water Hyacinth Re-invades Lake Victoria — consultado el 2026-09-13

ResearchGate: Biological Control of Water Hyacinth — A Case Study of Lake Victoria, Kenya — consultado el 2026-09-13

Citar — Evidoria. *Control Biológico del Jacinto de Agua en el Lago Victoria — Recuperando la Represa de Owen Falls y la Pesca en Uganda*. ID persistente: fb5122cd-b850-4bc2-9ddf-793e742d432e.