

Gestion de la zone humide Ramsar de Kopuatai Peat Dome (Waikato, Nouvelle-Zélande)

PES & Nature-Based Solutions · Good practice · Nouvelle-Zélande

Score de qualité : 67/100

Niveau de preuve : Descriptive / self-reported

Résumé

Le DOC gère les 10 201 ha de Kopuatai Peat Dome, la plus grande tourbière restiacée non modifiée de Nouvelle-Zélande et site Ramsar depuis 1989, dont la tourbe détient un stock moyen de carbone de 2 400 tonnes/ha accumulé sur environ 11 000 ans.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	3/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-07-16

[New Zealand Department of Conservation \(DOC\), in partnership with Waikato Regional Council](#) — consulté le 2026-07-16

[Wikipedia: Kopuatai Peat Dome](#) — consulté le 2026-07-16

[Science Media Centre: The climate-saving potential of our vanishing wetlands](#) — consulté le 2026-07-16

[Ramsar Sites Information Service: New Zealand Site No. 444](#) — consulté le 2026-07-16

Citer — Evidoria. *Gestion de la zone humide Ramsar de Kopuatai Peat Dome (Waikato, Nouvelle-Zélande)*. ID persistant : ab8be26d-96d7-4930-8d8c-480d4b41c7de.