

Zone humide de Nakivubo — Filtration naturelle des eaux usées avant le lac Victoria, et son déclin

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Ouganda

Score de qualité : 27/100

Niveau de preuve : Prudentes / limitées

Résumé

Une zone humide de papyrus filtre jusqu'à 99 % des coliformes fécaux de Kampala avant le lac Victoria, évaluée à 1 500–2 900 USD/ha/an en 1999 — mais elle a depuis perdu plus de la moitié de sa végétation, et en 2016 ne protégeait plus la qualité de l'eau.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-08-29

[Kampala Capital City Authority / National Water and Sewerage Corporation](#) — consulté le 2026-08-29

[IUCN/Uganda National Wetlands Programme valuation \(1999\)](#) — consulté le 2026-08-29

[World Bank / KCCA assessment \(2016\)](#) — consulté le 2026-08-29

[Kansiime & Nalubega treatment study](#) — consulté le 2026-08-29

[Fuhrimann et al. 2015, contamination study \(PMC\)](#) — consulté le 2026-08-29

Citer — Evidoria. *Zone humide de Nakivubo — Filtration naturelle des eaux usées avant le lac Victoria, et son déclin*. ID persistant : b5b26666-3da6-4c18-a499-b3b76257e5e1.