

Restauration nationale des herbiers de zostère et lignes directrices carbone bleu (Suède)

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Suède

Score de qualité : 53/100

Niveau de preuve : Observationnel / avant-après

Résumé

Depuis les années 1980, plus de 60 % (environ 12 500 ha) des herbiers de zostère ont disparu de la côte ouest de la Suède. Le groupe Zorro de l'université de Göteborg, soutenu par une subvention de 14 millions de couronnes suédoises de Formas et par l'agence maritime nationale, a produit le guide suédois de restauration et mené des reimplantations pilotes à Kålnäs (~5 ha) et à Malmö (8 ha).

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	2/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

C-NAPSE web research — consulté le 2026-08-02

University of Gothenburg (Zorro research group) with the Swedish Agency for Marine and Water Management — consulté le 2026-08-02

University of Gothenburg — ZORRO research group — consulté le 2026-08-02

University of Gothenburg — SEK 14m Formas grant news — consulté le 2026-08-02

Handbook for restoration of eelgrass in Sweden (national guideline, 2021) — consulté le 2026-08-02

Citer — Evidoria. *Restauration nationale des herbiers de zostère et lignes directrices carbone bleu (Suède)*. ID persistant : b58e309b-2fa9-4c31-a294-013c5585c09f.