

River Otter Beaver Trial — Des zones humides de castors sauvages réduisent les débits d'orage d'environ 30 % (Devon, Angleterre)

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Royaume-Uni

Score de qualité : 53/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

Dix ans de recherche de l'Université d'Exeter : débits de pointe ~30 % plus faibles, 6 millions de litres stockés par territoire et restitution lente lors de la sécheresse de 2022 ; résultats issus de quatre territoires seulement.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	1/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	3/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-10-01

[Devon Wildlife Trust / University of Exeter](#) — consulté le 2026-10-01

[Devon Wildlife Trust — research news](#) — consulté le 2026-10-01

[University of Exeter news](#) — consulté le 2026-10-01

[OPPLA case study](#) — consulté le 2026-10-01

Citer — Evidoria. *River Otter Beaver Trial — Des zones humides de castors sauvages réduisent les débits d'orage d'environ 30 % (Devon, Angleterre)*. ID persistant : 1fa9c712-5472-4071-9c3d-7cda82cbc734.