

Interprétation à distance par vidéo en langue des signes pour patients sourds — Un essai randomisé à Bogotá révèle des gains réels mais partiels

Digital Inclusion · Bonne pratique · Colombie

Score de qualité : 52/100

Niveau de preuve : Essai contrôlé randomisé

Résumé

Un essai randomisé portant sur 210 patients dans un hôpital public de Bogotá a testé l'interprétation à distance par vidéo en langue des signes pour les patients sourds par rapport à la communication standard, constatant des gains significatifs dans certains domaines, mais concluant que la technologie seule n'était pas suffisante.

Dimensions clés

Dimension	Score
Innovation level	3/5
Sustainability (ongoing)	0/1
Evaluation evidence	1/1
Demonstrated reach	0/1
Documented learning	1/1

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-12

[Clínica de Nuestra Señora de la Paz, with Universidad del Rosario, University of Geneva, Rochester Institute of Technology and University College London](#) — consulté le 2026-09-12

[PMC – Full text of the randomized clinical trial](#) — consulté le 2026-09-12

[JAMA Network Open – Video Remote Sign Language Interpreting and Health Communication for Deaf Patients: A Randomized Clinical Trial](#) — consulté le 2026-09-12

[ClinicalTrials.gov – NCT05966623](#) — consulté le 2026-09-12

Citer — Evidoria. *Interprétation à distance par vidéo en langue des signes pour patients sourds — Un essai randomisé à Bogotá révèle des gains réels mais partiels*. ID persistant : 059e4ae8-35c7-43de-9050-e765ddb4f651.