

La protection villageoise coutumière surpasse les zones fédérales sans prélèvement aux Samoa américaines

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Samoa américaines

Score de qualité : 40/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

Étude de 30 ans sur six îles (1994-2024, PeerJ) : bénitiers protégés par les fermetures fa'asao plus grands en moyenne (17cm) que dans les réserves fédérales sans prélèvement (11,2cm), le niveau de protection influant sur la densité ($p < 0,001$).

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	3/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-24

[Hawai'i Institute of Marine Biology; American Samoa Department of Marine & Wildlife Resources](#) — consulté le 2026-09-24

[University of Hawai'i News coverage](#) — consulté le 2026-09-24

[NOAA - American Samoa's Marine Protected Area System](#) — consulté le 2026-09-24

Citer — Evidoria. *La protection villageoise coutumière surpasse les zones fédérales sans prélèvement aux Samoa américaines*. ID persistant : cf64d9bf-7dda-4886-b048-80296ebf22c3.