

River Otter Beaver Trial — Zonas húmidas de castores selvagens reduzem caudais de tempestade em ~30% (Devon, Inglaterra)

PES & Nature-Based Solutions · Boa prática · Reino Unido

Pontuação de qualidade: 53/100

Força da evidência: Moderada

Sumário

Dez anos de investigação da Universidade de Exeter: caudais de ponta ~30% menores, 6 milhões de litros armazenados por território e libertação lenta na seca de 2022; resultados de apenas quatro territórios.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Carbon — sequestration / storage, evidenced	1/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	3/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-10-01

[Devon Wildlife Trust / University of Exeter](#) — acedido a 2026-10-01

[Devon Wildlife Trust — research news](#) — acedido a 2026-10-01

[University of Exeter news](#) — acedido a 2026-10-01

[OPPLA case study](#) — acedido a 2026-10-01

Citar — Evidoria. *River Otter Beaver Trial — Zonas húmidas de castores selvagens reduzem caudais de tempestade em ~30% (Devon, Inglaterra)*. ID persistente: 1fa9c712-5472-4071-9c3d-7cda82cbc734.