

Proteção Costumeira de Aldeias Supera Zonas Federais de Captura Proibida na Samoa Americana

PES & Nature-Based Solutions · Boa prática · Samoa Americana

Pontuação de qualidade: 40/100

Força da evidência: Moderada

Sumário

Levantamento de 30 anos em seis ilhas (1994-2024, PeerJ): amêijoas protegidas pelos encerramentos fa'asao atingiram tamanhos maiores (17cm) do que nas reservas federais de captura proibida (11,2cm); nível de proteção influenciou a densidade ($p<0,001$).

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	3/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-09-24

[Hawai'i Institute of Marine Biology; American Samoa Department of Marine & Wildlife Resources](#) — acedido a 2026-09-24

[University of Hawai'i News coverage](#) — acedido a 2026-09-24

[NOAA - American Samoa's Marine Protected Area System](#) — acedido a 2026-09-24

Citar — Evidoria. *Proteção Costumeira de Aldeias Supera Zonas Federais de Captura Proibida na Samoa Americana*. ID persistente: cf64d9bf-7dda-4886-b048-80296ebf22c3.